

# Impfkalender 2013

Angelehnt an:  
Mitteilungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut/ Stand August 2013  
Epidemiologisches Bulletin 26. August 2013/Nr. 34

Der Impfkalender für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene umfasst Impfungen zum Schutz vor

Tetanus (T)  
Diphtherie (D/d)  
Pertussis (aP/ap)  
Haemophilus influenzae  
Typ b (Hib)  
Poliomyelitis (IPV)  
Hepatitis B (HB)  
Pneumokokken  
Rotaviren (RV)  
Meningokokken C  
Masern  
Mumps } MMR  
Röteln }  
Varizellen  
Humane Papillomviren  
(HPV)  
Influenza

## Neuigkeiten 2013 (Aus: Pressemitteilung des Robert-Koch-Instituts vom 26.8.2013)

Die neu empfohlene **Rotavirus-Impfung** wird als Schluckimpfung gegeben, die Impfserie sollte im Alter von sechs bis zwölf Wochen beginnen und je nach Impfstoff bis zur vollendeten 24. oder 32. Lebenswoche beendet sein. Rotaviren sind die häufigste Ursache von Magen-Darm-Infektionen bei Kindern unter fünf Jahren. Jährlich kamen etwa 20.000 Kinder in Deutschland aufgrund einer Rotavirus-Infektion ins Krankenhaus.


Nach einer erfolgreich durchgeführten **Hepatitis-B-Grundimmunisierung** ist keine Auffrischimpfung mehr notwendig.

Bei der **Influenza-Impfung** empfiehlt die STIKO nun, bei Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, bei denen wegen einer Grundkrankheit eine Impfung empfohlen ist, bevorzugt einen Impfstoff zu verwenden, der nicht mehr mit einer Spritze verabreicht, sondern in die Nase gesprüht wird. Im Vergleich zum Vorjahr wird die Influenza-Impfung jetzt nicht nur Personen empfohlen, die eine ungeimpfte Risikoperson betreuen, sondern auch Personen, die eine geimpfte Risikoperson betreuen.

Wegen der besonderen Gefährdung in der frühen Kindheit sollen die empfohlene Impfungen für Säuglinge möglichst frühzeitig durchgeführt werden und die Grundimmunisierungen spätestens bis zum Alter von 14 Monaten (bzw. 23 Monaten bei MMR = Mumps, Masern, Röteln und Varizellen) abgeschlossen sein.

Spätestens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (d. h. bis zum Tag vor dem 18. Geburtstag) sind versäumte Impfungen nachzuholen. Es ist zu beachten, dass die Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ b (Hib) nur bis zum 5. Geburtstag und die Pneumokokken-Impfung nur bis zum 2. Geburtstag nachgeholt werden.

Die Überprüfung und ggf. Vervollständigung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort nachgeholt werden. Für einen lang dauernden Impfschutz ist es von besonderer Bedeutung, dass bei der Grundimmunisierung der empfohlene Mindestabstand zwischen vorletzter und letzter Impfung (in der Regel 6 Monate) nicht unterschritten wird.

Erläuterungen	
G	Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1-G4)
A	Auffrischimpfung
S	Standardimpfung
N	Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfung) 

IMPfung	ALTER IN WOCHEN	ALTER IN MONATEN				
	6	2	3	4	11-14	15-23
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N
Hib Haemophilus influenzae Typ b		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N
Poliomyelitis		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N
Hepatitis B		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N
Pneumokokken		G1	G2	G3	G4	N
Rotaviren	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)			
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)	
Masern					G1	G2
Mumps					G1	G2
Röteln					G1	G2
Varizellen					G1	G2
Influenza						
HPV Humanes Papillomavirus						

ALTER IN JAHREN					
2-4	5-6	9-11	12-17	ab 18	ab 60
N	A1	A2		A (ggf. N) <sup>f</sup>	
N	A1	A2		A (ggf. N) <sup>f</sup>	
N	A1	A2		A (ggf. N) <sup>f</sup>	
N					
N		A1		ggf. N	
N					
					S <sup>c</sup>
N					
N				S <sup>d</sup>	
N					
N					
N					
					S (jährlich)
			S <sup>e</sup>		

- a** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c** Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen
- d** Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff
- e** Standardimpfung für Mädchen und junge Frauen
- f** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.