

Impfkalender 2019

Angelehnt an:
Epidemiologisches Bulletin 34, August 2019

Der Impfkalender für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene umfasst Impfungen zum Schutz vor

Tetanus (T)

Diphtherie (D/d)

Pertussis (aP/ap)

Haemophilus influenzae Typ b (Hib)

Poliomyelitis (IPV)

Hepatitis B (HB)

Pneumokokken

Rotaviren (RV)

Meningokokken C

Masern

Mumps

Röteln

} MMR

Varizellen

Humane Papillomviren (HPV)

Influenza

Herpes Zoster (HZ)

Wissenswertes

Zur Verhinderung der Herpes-Zoster-Erkrankung (HZ) und der Postherpetischen Neuralgie (PHN) empfiehlt die STIKO seit Dezember 2018 den Herpes-Zoster-Totimpfstoff Shingrix als Standardimpfung (S) für alle Personen ≥ 60 Jahren. Zudem empfiehlt die STIKO die Impfung als Indikationsimpfung (I) für Personen ≥ 50 Jahren mit einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung für das Auftreten eines HZ infolge einer Grundkrankheit oder für Personen mit angeborener bzw. erworbener Immundefizienz bzw. Immunsuppression (z.B. Patienten mit HIV, Rheumatoider Arthritis, Lupus erythematodes, chronisch entzündlichen Lungen- oder Darmerkrankungen, Asthma bronchiale, Diabetes mellitus, chronischer Niereninsuffizienz).

Die Impfung für den HZ-Totimpfstoff umfasst zwei Impfstoffdosen, die intramuskulär im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten verabreicht werden.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat die Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) für alle Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren empfohlen. Eine Nachholimpfung wird bis zum Alter von 17 Jahren empfohlen.

Wegen der besonderen Gefährdung in der frühen Kindheit sollen die empfohlene Impfungen für Säuglinge möglichst frühzeitig durchgeführt werden und die Grundimmunisierungen spätestens bis zum Alter von 14 Monaten (bzw. 23 Monaten bei MMR = Mumps, Masern, Röteln und Varizellen) abgeschlossen sein.

Spätestens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (d. h. bis zum Tag vor dem 18. Geburtstag) sind versäumte Impfungen nachzuholen. Es ist zu beachten, dass die Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ b (Hib) nur bis zum 5. Geburtstag und die Pneumokokken-Impfung nur bis zum 2. Geburtstag nachgeholt werden.

Die Überprüfung und ggf. Vervollständigung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort nachgeholt werden. Für einen lang dauernden Impfschutz ist es von besonderer Bedeutung, dass bei der Grundimmunisierung der empfohlene Mindestabstand zwischen vorletzter und letzter Impfung (in der Regel 6 Monate) nicht unterschritten wird.

Eine Impfung gegen Scharlach gibt es nicht.

Erläuterungen	
G	Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1-G4)
A	Auffrischimpfung
S	Standardimpfung
N	Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfung)



IMPfung	ALTER IN WOCHEN	ALTER IN MONATEN					ALTER IN JAHREN							
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)											
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2	N		A (ggf. N) ^e	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2	N		A (ggf. N) ^e	
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2	N		A (ggf. N) ^e	
Hib Haemophilus influenzae Typ b		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N							
Polio my elitis		G1	G2 ^c	G3	G4	N		N		A1	N		ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2 ^c	G3	G4	N		N						
Pneumokokken ^a		G1		G2	G3	N								S ^g
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)			N						
Masern					G1	G2		N					S ^f	
Mumps, Röteln					G1	G2		N						
Varizellen					G1	G2		N						
HPV Humanes Papillomavirus										G1 ^d	G2 ^d	N ^d		
Herpes Zoster														G1 ^h G2 ^h
Influenza														S (jährlich)

a

b

c

d

e

f

g

h

Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Dosen

Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

Standardimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 Geborene ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

Zweimalige Impfung mit dem adjuvanten Herpes-Zoster-Totimpfstoff von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.