

Impfkalender 2020

Angelehnt an:
Epidemiologisches Bulletin 34, August 2020

Der Impfkalender für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene umfasst

Tetanus (T)

Diphtherie (D/d)

Pertussis (aP/ap)

Haemophilus influenzae Typ b (Hib)

Poliomyelitis (IPV)

Hepatitis B (HB)

Pneumokokken

Rotaviren (RV)

Meningokokken C

Masern

Mumps

Röteln

} **MMR**

Varizellen

Humane Papillomviren (HPV)

Influenza

Herpes Zoster (HZ)

Wissenswertes

Inhaltlichen Änderungen gegenüber der letzten STIKO-Empfehlung: Empfehlung einer Impfung gegen **Keuchhusten für Schwangere**; Empfehlung zur Impfung gegen Japanische Enzephalitis bei Reisen in Endemiegebiete und für Laborpersonal, die Empfehlung zur Grundimmunisierung gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Hib und Hepatitis B im Säuglingsalter (6-fach-Impfstoff sowie die Angleichung der beruflich indizierten MMR- und Varizellen-Impfung.

Der Bundestag hat am 14.11.2019 eine **Impfpflicht gegen Masern** beschlossen.

Die Impfpflicht trat am 1. März 2020 in Kraft. Eltern müssen künftig die Impfung ihrer Kinder nachweisen, bevor sie in Kindergärten oder Schulen angemeldet werden können. Impfpflicht auch für das Personal in Kitas, für Tagesmütter, in medizinischen und in Gemeinschaftseinrichtungen (Flüchtlingsunterkünfte, Schulen).

Zur Verhinderung der **Herpes-Zoster-Erkrankung (HZ)** und der Postherpetischen Neuralgie (PHN) empfiehlt die STIKO seit Dezember 2018 den Herpes-Zoster Totimpfstoff Shingrix als Standardimpfung (S) für alle Personen ≥ 60 Jahren. Zudem als Indikationsimpfung (I) für Personen ≥ 50 Jahren mit einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung für das Auftreten eines HZ infolge einer Grundkrankheit (z.B. Patienten mit HIV, Rheumatoider Arthritis, Lupus erythematodes, chronisch entzündlichen Lungen- oder Darmerkrankungen, Asthma bronchiale, Diabetes mellitus, chronischer Niereninsuffizienz).

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat die Impfung gegen **Humane Papillomviren (HPV)** für alle Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren empfohlen. Eine Nachholimpfung wird bis zum Alter von 17 Jahren empfohlen.

Wegen der besonderen Gefährdung in der frühen Kindheit sollen die empfohlene Impfungen für Säuglinge möglichst frühzeitig durchgeführt werden und die Grundimmunisierungen spätestens bis zum Alter von 14 Monaten (bzw. 23 Monaten bei MMR = Mumps, Masern, Röteln und Varizellen) abgeschlossen sein.

Spätestens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (d. h. bis zum Tag vor dem 18. Geburtstag) sind versäumte Impfungen nachzuholen. Es ist zu beachten, dass die Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ b (Hib) nur bis zum 5. Geburtstag und die Pneumokokken-Impfung nur bis zum 2. Geburtstag nachgeholt werden.


Eine Impfung gegen Scharlach gibt es nicht.


IMPfung	ALTER IN WOCHEN	ALTER IN MONATEN									ALTER IN JAHREN							
Alter	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Vorsorgeuntersuchung			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e	
Diphtherie ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e	
Pertussis		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A3 ^e	
Hib ^b Haemophilus influenzae Typ b		G1		G2		G3 ^c												
Poliomyelitis ^b		G1		G2		G3 ^c								A1				
Hepatitis B ^b		G1		G2		G3 ^c												
Pneumokokken ^b		G1		G2		G3 ^c												S ^g
Meningokokken C							G1											
Masern**						G1			G2								S ^f	
Mumps, Röteln						G1			G2									
Varizellen						G1			G2									
HPV Humanes Papillomavirus													G1 ^d	G2 ^d				
Herpes Zoster																	G1 ^h	G2 ^h
Influenza																	S (jährlich)	

G Grundimmunisierung

A Auffrischung

S Standardimpfung

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

a
b
c
d
e
f
g
h

Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate
Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich
Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 Geborene ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
Zweimalige Impfung mit dem adjuvanten Herpes-Zoster-Totimpfstoff von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden
Der Bundestag hat am 14.11.2019 eine Impfpflicht gegen Masern beschlossen, die am 01.03.2020 in Kraft trat.